

Insect van november 2009,
Cordylobia anthropophaga (Blanchard), de Tumbuvlieg.

Een souvenir welke af en toe ongewild uit Afrika wordt meegenomen is de larve van deze Tumbuvlieg. Ze veroorzaakt opvallende bolvormige zwellingen. Ze krijgt daardoor ook wel de naam Mango-fly. Het is een vrij bekende veroorzaker van deze infecties, myiasis genoemd, in Afrika ten zuiden van de Sahara. De eieren van de vlieg worden niet



op de huid afgezet, maar in vooral zandige beschaduwde grond, waarin liefst nog wat urine of faecesresten aanwezig zijn. Ook kleren na die was te drogen worden gelegd of gehangen en daarna niet gestreken worden door deze vlieg wel gebruikt als eilegplaats. De larve kan een aantal dagen zonder voedsel, maar zal



zich op de huid beland snel ingraven, waar ze de eerste dagen jeuk veroorzaakt. Daarna zal het snel zwellingen veroorzaken om na een paar weken als volwassen made zich naar buiten te boren om daarna in de grond te verpoppen. Honden vormen onder gedomesticeerde huisdieren een belangrijk infectiereservoir. Een infectie met de Tumbuvlieg zal over het algemeen geen nadelige gevolgen hebben.

Op de foto een symptoom waar de persoon in kwestie wel een beetje trots op is!
Adulte Tumbuvliegen, met dank aan het Museum voor Centraal Afrika in Tervuren bij Brussel.